

Avertissements agricoles

DLP 26 - 9 - 38150528 ISSN 0751-154 X ®



Grandes cultures

Bulletin technique n° 23 du 20 septembre 1988

COLZA

- * GROSSES ALTISES : des captures et quelques morsures
- * LE POINT SUR LE DESHERBAGE DE POST-LEVÉE

COLZA

GROSSES ALTISES : le vol se poursuit

Le vol continue au même rythme que la semaine dernière : capture d'environ 5 altises par jour dans les postes de WIWERSHEIM (67) - SOULTZ SOUS FORETS (67). Les captures sont nulles à ASPACH-LE-BAS (68).

La semaine dernière, des morsures ont été observées dans certaines parcelles de colza. Si le temps devient plus sec, l'activité des insectes pourrait s'intensifier.

- Surveillez les cultures peu avancées.
- Estimez l'importance des attaques avant de traiter.
- Consultez le tableau des matières actives utilisables sur la fiche couleur ci-jointe.

Seuil d'intervention contre la grosse altise adulte :

- . 3 pieds sur 10 avec morsures jusqu'au stade "2 feuilles vraies"
- . 20 à 30 captures cumulées en piège jaune après ce stade.

LE POINT SUR LE DESHERBAGE DE POST LEVÉE

→ Contre les repousses de céréales

En cas d'infestation massive et précoce (dès la levée du colza) : intervenez rapidement avec un herbicide à action foliaire (Fervin, Fervinal, Fusilade X2, Gallant ou Targa).

Par temps chaud, traitez de préférence le soir.

En cas de levées échelonnées : attendez qu'un maximum de repousses soient présentes pour intervenir. Utilisez un herbicide à action foliaire (voir précédemment) mais tenez compte du stade végétatif des repousses pour définir la dose d'emploi. En application tardive, les herbicides racinaires peuvent aussi être utilisés (Kerb 50, Légurame PM).

→ Contre matricaires, laiters ...

Utilisez Lontrel SF 100

→ Herbicides utilisables en post-levée du colza : consultez le tableau ci-joint.

Imprimerie de la Station de STRASBOURG
Directeur-Gérant: P. BERTHIER

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
D.R.A.F.
Service Régional de la Protection des Végétaux

Publication périodique
CPPAP n° 1848 AD
Abonnement annuel: 180,- F

Cité Administrative
67084 STRASBOURG CEDEX
T 88.37.32.18
Bas-Rhin: 88.69.65.89 - Haut-Rhin: 89.72.49.70

P 320




DESHERBAGE COLZA Herbicides utilisables en post levée

	Matière active	Spécialité commerciale	Dose/ha de spécialité	OBSERVATIONS
post-levée précoce	métazachlore	BUTISAN S	2,5 l	A utiliser dès le stade "cotylédons étalés - 1ère feuille pointante du colza". La firme préconise ce type d'application pour les semis en conditions difficiles. A la dose de 2,5 l, avant la levée des adventices : Bon sur Capselle, Coquelicot, Mouron. Moyen sur Véronique et Pensée.
	carbétamide	LEGURAME M	3 kg 5 à 6 kg	Depuis le stade 4 feuilles vraies du colza (B4) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation. Application possible sur sol gelé. Bonne action sur graminées Insuffisante sur dicotylédones contre chiendent de Novembre à fin janvier
post-levée	propyzamide	KERB flo	1,25 l 2,5 l 3,7 l	A partir du stade 2 feuilles vraies du colza (B2) jusqu'à la reprise de végétation. Application sur sol gelé Bonne action sur graminées Insuffisante sur dicotylédones contre Avoine à chapelet contre chiendent rampant
	propyzamide + diuron	KERB ULTRA	1,2 kg	A partir du stade 4 feuilles vraies bien développées, 6ème feuilles naissante des colzas sains bien implantés. De préférence avant l'hiver. Bonne action sur graminées Action limitante sur Sanves, Ravenelles. A utiliser par temps humide couvert et frais.
	carbétamide + diméfurone	PRADONE TS	3,5-4 kg	A partir du stade 6 feuilles vraies (B6) des colzas sains et bien implantés Application possible sur sol gelé Action sur dicotylédones : * efficace sur véronique, Matricaire, Stellaire, Coquelicot, Lamier * irrégulier sur : Pensée, Gaillet * Insuffisant sur : Sanve
	diméfurone + clopyralide	CLERDONE	2,5 l	Sur colza sain bien enraciné (pivot > 10 cm), à partir du stade 4 feuilles vraies du colza. Bonne action antidicotylédone. Ne pas utiliser en mélange avec un antigraminée à action foliaire ; respecter 10 jours d'intervalle entre les traitements. Peut s'utiliser en mélange avec un antigraminée à action racinaire. * Sur Capselle : intérêt du programme : BUTISAN 1,5 l post-semis CLERDONE 2,5 l post-levée * Sur Géranium : intérêt du programme : DEVIRINOL : 2,2 l post-semis CLERDONE : 2,5 l post-levée
	clopyralid	LONTREL SF 100	0,75 à 1,25 l + huile SCHERING 3 l/ha	S'emploie de la levée du colza jusqu'au stade boutons floraux Spectre d'action : Composés (Matricaires, Anthémis, Chardons, Laiterons) et Légumineuses.

REMARQUE : BUTISAN S, utilisable en post-levée précoce figurait dans le tableau "herbicides utilisables au moment du semis" diffusé dans un précédent bulletin.

RAVAGEURS DU COLZA

Cherchez-les au bon moment...



Dessins de A. GRAVAUD (Service de la Protection des Végétaux).


... avec la bonne méthode...

Le piégeage ou technique de la cuvette jaune

- **Mise en place des cuvettes** : dès le semis, ou au plus tard à la levée, dès les premiers réchauffements, les installer à 10 mètres de la bordure, du côté d'un ancien champ de colza; les remplir avec 1 litre d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle.

Jusqu'au stade B2, la cuvette est enterrée, puis elle est placée à 25 cm de hauteur.

Attention ! Le fond de la cuvette doit suivre le niveau supérieur de la végétation.



- **Surveillance** : 2 fois par semaine et tous les jours après les premières captures.
- **Insectes capturés** : grosse altise, charançon du bourgeon terminal, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

L'observation des plantes

- **Observez 50 plantes** au hasard sur l'ensemble de la parcelle.
- **Insectes** : grosse altise (larve et adulte), puceron cendré du chou, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

... et comptez-les

P 321

Quand faut-il traiter ?

Ravageur	Observation des plantes	Piégeage "cuvette jaune"
Limace	dès les premiers dégâts, du semis au stade B2	
Grosse altise adulte	3 pieds/10 avec morsures nutritionnelles, jusqu'au stade B2	20 à 30 captures cumulées après le stade B2
Grosse altise larve	2 plantes/3 attaquées	
Puceron cendré	— automne 1 plante/5 colonisée — de C1 à 3-4 semaines avant la récolte : 2 colonies/m²	
Charançon du bourgeon terminal		notez les premières captures : intervenez 10 à 15 jours après si le colza est au stade B3
Gros charançon de la tige		après les premières captures, intervenez en tout début d'intensification du vol (stades C1 à T20)
Meligèthe	— stades boutons accolés à D1 : 1 insecte par inflorescence — stades boutons séparés à E : 2 ou 3 insectes	vous indique les premières arrivées vous pouvez alors aller observer
Charançon des siliques	à partir des stades G2 G3 : 1 charançon pour 2 pl.	

Les produits de traitement

• Contre les limaces

- appâts empoisonnés sous forme granulée, épandre régulièrement le soir (25 granulés par m²)
- matières actives : mercaptodiméthur (3 à 5 kg/ha selon les spécialités commerciales)
métaldéhyde (5 à 10 kg/ha selon les spécialités commerciales)

• Contre les insectes

Au semis		De la levée à la fin du repos hivernal		Produits utilisables (1)		A partir de la reprise de végétation			
Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Matières actives	Spécialités commerciales	Charançon de la tige	Meligèthe	Charançon des siliques	Puceron
9 kg				Benfuracarbe	Oncol 5 G				
9 kg	9 kg			Carbofuran	Nombreuses spécialités (2)				
12 kg	12 kg			Furathiocarbe	Deltanet				
10 kg				Terbuphos	Counter plus				
9 kg				Thiofanox	Dacamox 5 G - Dacamox 5 S				
18 kg				Phorate + Terbuphos	Dispell				
		0,15 l		Alphaméthrine	Fastac	0,15 l	0,2 l	0,2 l	
		0,07 l		Biphenthrine	Talstar	0,07 l	0,1 l	0,1 l	
				Bromophos	Nexion 25 - Sovinexion 25 Nexion 40 - Nexion EC 40		2 l 1,4 l	2 l	2 l
		0,3 l	0,3 l	Cyfluthrine	Baythroid	0,3 l	0,2 l	0,2 l	
		0,25 l 25 g ma/ha		Cyperméthrine	Cymbush, Kafil super Nombreuses spécialités (2)	0,25 l	0,25 l 20 g ma/ha	0,25 l	
		0,2 l		Deltaméthrine	Décis CE - Décis RU Décis Flo	0,3 l 0,3 l	0,2 l 0,2 l	0,2 l	
				Dialiphos	Torak		1,25 l	1,25 l	
		250 g ma/ha		Endosulfan	Nombreuses spécialités (2)	400 g ma/ha	250 g ma/ha	600 g ma/ha	
		0,6 l		Esfenvalérate	Sumi alfa		0,5 l		
		0,5 l		Fenvalérate	Sumicidin 10		0,4	0,4 l	
		0,2 l		Fluvalinate	Mavrik		0,2 l		0,2 l
		0,15 l		Lambda-Cyhalothrine	Karate	0,15 l	0,1 l	0,1 l	
		200 g ma/ha		Lindane Lindane huileux	Nombreuses spécialités (2)	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		1,5 l ou 1,5 kg		Malathion	Nombreuses spécialités (2)		1,5 l ou 1,5 kg		
		1,25 kg		Méthidathion	Ultracide 20 bouillie Ultracide 20 liquide	1,5 kg 1,5 l	1,25 kg 1,25 l		
		200 g ma/ha		Parathion Ethyl et Méthyl	Nombreuses spécialités (2)	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		200 g ma/ha		Parathion huileux	Nombreuses spécialités (2)	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
				Phosalone	Zolone Flo - Azofène Flo Nombreuses spécialités (2)		2 l 1000 g ma/ha	2,5 l 1200 g ma/ha	1,2 l
				Pyrimicarbe	Pirimor G - Aphox				0,5 kg
		0,75 l		Endosulfan + Parathion Ethyl	Drifène AP - Ekadrine PE	1,25 l	0,75 l		
				Endosulfan + Thiométon	Serk				1,5 l
		1 l 3 l		Lindane + Parathion Ethyl	Sopragam Typholine gamma 50	1,5 l 5 l	1 l 3 l		
		1,75 l		Lindane + Parathion Méthyl	Paralindex	2,5 l	1,75 l		
		0,75 l 0,75 l		Phosalone + Parathion Méthyl	Fortène Taxylone	1,5 l	0,75 l 0,75 l		

(1) Doses en l ou kg de produit commercial par ha.

(2) La dose de matière active par hectare mentionnée correspond à la dose de matière la plus fréquente. Avant toute utilisation, vérifier la dose de produit commercial autorisée sur l'étiquette.

Liste arrêtée au 1.9.88 S.P.V.